



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

METOXI-POLIETILENGLICOL-EPOETINA BETA (MIRCERA®)

30, 50, 100, 120, 150, 200, 250 mcg jeringa precargada



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*


METOXI-POLIETILENGLICOL-EPOETINA BETA (MIRCERA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados **antianémicos**. Se utiliza para tratar la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica. Funciona igual que la hormona natural eritropoyetina, ayudando a la médula ósea a producir más **glóbulos rojos**.

¿Cómo tomarlo?

Se debe administrar por **vía subcutánea** los días que le indique su médico. Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si queda menos de una semana para la próxima administración, continúe con su calendario habitual.

¿Cómo conservarlo?

Conserve en la **nevera** (NUNCA en el congelador). Si se le olvidara fuera de la nevera, no la tire y avise a su farmacéutico cuanto antes. Una vez utilizadas las **jeringas**, tírelas al **contenedor** que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer **hematoma, dolor, hinchazón, eritema**. También pueden aparecer **dolor de cabeza dolor de espalda y artralgia**, coágulos en la sangre (trombosis), hipertensión arterial, retención de fluidos (edema periférico). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- Para que el tratamiento sea efectivo es necesario que los niveles de hierro sean adecuados. En algunos casos, su médico podría recomendarle suplementos de hierro.
- Mircera® se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Si tiene algún problema con la jeringa y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvala a la Farmacia del Hospital.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia.
- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org