



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MARAVIROC (CESENTRI®)

150 y 300 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# MARAVIROC (CESENTRI®)

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Maraviroc es un fármaco que bloquea el receptor CCR5 del VIH que utiliza para entrar e infectar las células sanguíneas, y que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomar maraviroc CON o SIN alimentos. En caso de necesidad, maraviroc podría triturarse.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal**, hormigueo, erupción en la piel con picores y cansancio. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



## ¡Atención!

Los comprimidos contienen **lecitina de soja**, polivinilalcohol y almidón glicolato de sodio. No tome maraviroc si es usted alérgico al **cacahuete o la soja**.

Comuníquese si está tomando antibióticos como la **rifampicina, claritromicina y telitromicina** y **antifúngicos como el voriconazol e itraconazol**, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales. La administración concomitante de **Hierba de San Juan** está contraindicada.

Las **mujeres en edad fértil** deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con maraviroc. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



## Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comuníquese cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)