



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MITOMICINA 0,04 % colirio

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

## MITOMICINA 0,04 % colirio



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para el tratamiento de las neoplasias corneales y conjuntivales, glaucoma refractario y en el postoperatorio de cirugía de pterigion.



### Composición


#### Composición por 10 mL

Mitomicina	4 mg
Suero fisiológico 0,9%	2 mL
Agua para inyección	8 mL



### ¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita. Es **recomendable la utilización de guantes**, especialmente si se lo va administrar a otra persona. Lávese nuevamente las manos tras la administración.
- **Cierre los ojos** durante 1-2 minutos **tras la administración**. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre administraciones.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



### ¿Cómo conservarlo?

Debe conservarlo en nevera y protegido de la luz. Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días. No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.



### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



### ¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales, etc.). **No use ciclosporina colirio sin primero hablar con su médico si está usted embarazada.** No se conocen los riesgos que podría tener para el bebé. Evitar su uso durante la lactancia materna.



### Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio **lave la zona con agua** abundante.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)