



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SORAFENIB (NEXAVAR®)

(comprimidos de 200 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# SORAFENIB (NEXAVAR®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Sorafenib es un inhibidor de multiquinasas que inhibe el crecimiento tumoral. Está indicado, en el tratamiento del carcinoma hepático, renal y de tiroides.



## ¿Cómo tomarlo?

Debe tomarlas fuera de las comidas (1 h antes o 2 h después) o con comida moderada y baja en grasas. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas. Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a menos que hayan transcurrido más de 6 h. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Sorafenib puede producir náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dermatitis, erupciones cutáneas (especialmente en manos y pies), alopecia, fatiga, hipertensión, dolor de cabeza...
- Hipertensión: controle su tensión arterial especialmente las seis primeras semanas.
- Reacciones cutáneas: Utilice jabones neutros y cremas hidratantes. Evite duchas demasiado calientes. Beba abundantes líquidos para hidratar la piel.
- Sorafenib puede irritar o dañar la boca. Manténgala limpia para prevenir infecciones.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Comunique a su médico o farmacéutico si presenta reacción alérgica grave, signos de infección, sangrado en heces u orina, dolor en el pecho o palpitaciones, o cualquier otro síntoma de importancia.
- Debe evitar el embarazo y la lactancia mientras esté tomando este medicamento. Si es una mujer en edad fértil o mantiene relaciones con una mujer en edad fértil, utilice medidas anticonceptivas durante el tratamiento y hasta 14 días después de su finalización.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



## Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org