



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### NEVIRAPINA 200 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# NEVIRAPINA

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Nevirapina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Confirme si se le ha pautado la mitad de dosis (1 comprimido al día) durante los primeros 14 días. Puede tomar nevirapina **CON o SIN ALIMENTOS**.

No masticar ni triturar el comprimido.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se da cuenta de que ha olvidado una dosis dentro de las 8 horas posteriores a la hora programada, tome la dosis lo antes posible y siga con el horario habitual. De lo contrario, espere a la siguiente dosis. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **erupción leve, dolor de cabeza, malestar general, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cansancio, fiebre**.

Durante las primeras 18 semanas de tratamiento es muy importante que vigile la aparición de **reacciones cutáneas o hepáticas**. Debe interrumpir inmediatamente el tratamiento y comunicárselo a su médico o farmacéutico en caso de:

-Síntomas importantes de alergia (erupción grave, hinchazón de la cara, dificultad para respirar, fiebre, malestar general).

-Síntomas que sugieran daño en el hígado (pérdida de apetito, náuseas, vómitos, coloración amarilla de la piel, dolor abdominal).

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



## ¡Atención!

Los comprimidos contienen **lactosa**. Informe a su médico o farmacéutico si padece intolerancia a la lactosa u otros azúcares.

Comunique el uso de **anticonceptivos o terapia hormonal** (su eficacia puede verse reducida), anticoagulantes, antibióticos y antifúngicos, pues pueden interferir con el efecto de nevirapina. No tome Hierba de San Juan durante el tratamiento.

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.



## Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)