



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NINTEDANIB (OFEV®)

(100 y 150 mg cápsulas)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

NINTEDANIB (OFEV®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Nintedanib se utiliza para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares intersticiales.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las **cápsulas enteras** sin masticarlas, abrirlas ni disolverlas. Tome las cápsulas **con alimentos**, dos veces al día y con aproximadamente 12 horas de diferencia. En caso de entrar en contacto con el contenido de la cápsula, se deben lavar las manos inmediatamente con abundante agua.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tome la siguiente dosis en el horario habitual. **Nunca tome una dosis doble** para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, disminución del apetito y peso, aumento de las enzimas hepáticas y sangrado de nariz**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con una mujer fértil debe **utilizar medidas anticonceptivas dobles hasta 3 meses** después de finalizar el tratamiento con nintedanib. Las **mujeres embarazadas o en periodo de lactancia** deben evitar manipular este medicamento.

Si es alérgico a **la soja o a los cacahuetes**, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

Recuerde ...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Nintedanib puede interactuar con diversos medicamentos** (ej. ketoconazol, carbamazepina, fenitoína, eritromicina o hierba de San Juan).
- Ante los primeros **síntomas de diarrea, beba abundante líquido y consulte con su médico.**
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org