



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

OMEPRAZOL

Solución 2 mg/ml frasco 50 mL



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



OMEPRAZOL 2 mg/mL solución oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Este fármaco se emplea para el tratamiento o la prevención de alteraciones gastrointestinales y/o para tratar una producción excesiva de ácido gástrico.



¿Cómo tomarlo?

Administrar preferiblemente por las mañanas antes del desayuno seguido de un vaso de agua; si se necesita una segunda dosis se tomará una hora antes de la cena. Agite bien el medicamento antes de administrarlo.

No mezclar su administración con alimentos ácidos como zumos o yogurt.

Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Conservar refrigerado en nevera (entre 2-8°C). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer dolor de cabeza, mareos, diarrea, estreñimiento. Si son severos, informe a su médico. No tome este medicamento si es alérgico a omeprazol o a alguno de los componentes de la fórmula. Es recomendable evitar el consumo de alimentos que produzcan irritación gástrica (ej: zumos de frutas ácidas, bebidas excitantes, salsas picantes...).



¿Cómo se elabora?

Composición por 100 ml:

Omeprazol (como Omeprazol 40 mg vial).....5 ud

Agua para laboratorio RFE.....c.s.p 100 ml



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org