



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DORAVIRINA (PIFELTRO®)

100 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DORAVIRINA (PIFELTRO®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Pifeltro® es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomarse **CON o SIN ALIMENTOS**. No masticar ni triturar el comprimido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: trastornos del sistema nervioso (sueños anormales, insomnio, mareos, dolor de cabeza, somnolencia), trastornos gastrointestinales (flatulencia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), erupción, prurito cutáneo y elevación de transaminasas. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

¡Atención!

- Los comprimidos de Pifeltro® contienen **lactosa**. Informe a su médico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.
- Doravirina no debe administrarse con medicamentos que sean inductores potentes de las enzimas del citocromo P450 CYP3A, como son, entre otros: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, rifapentina e hierba de San Juan.
- Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

Recuerde...

- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org