



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E
psiquiatria

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

POSACONAZOL (NOXAFIL®)

100 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

POSACONAZOL

¿Qué es y para qué se utiliza?

Posaconazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antifúngicos. Actúa matando o deteniendo el crecimiento de algunos tipos de hongos. Se utiliza para tratar infecciones fúngicas o para prevenirlas en adultos con mayor riesgo de desarrollarlas, como los pacientes que presentan un sistema inmunitario débil.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Puede tomar posaconazol **CON O SIN ALIMENTOS**. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar ni triturar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Informe a su médico o farmacéutico si nota cualquiera de los siguientes efectos adversos: **náuseas o vómitos**, **diarrea**, signos de **problemas hepáticos** (amarilleamiento de la piel o blanco de los ojos, orina oscura o heces pálidas, pérdida de apetito, cansancio o debilidad inusuales, aumento de enzimas hepáticas en análisis de sangre) o **reacción alérgica**. También pueden aparecer otros efectos adversos como: niveles inusuales de sales en sangre (cuyos signos incluyen confusión o debilidad), entumecimiento, picor o erupciones en la piel, dolor de cabeza, presión arterial alta, ardor y malestar de estómago, flatulencia, estreñimiento, cambios en el sentido del gusto, fiebre y neutropenia.

Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

¡Atención!

Posaconazol no debe administrarse conjuntamente con los siguientes medicamentos: **terfenadina**, **astemizol**, **cisaprida**, **pimozida**, **halofantrina** y **quinidina** (posaconazol puede incrementar los niveles de estos medicamentos en sangre y provocar alteraciones en su ritmo cardíaco), **alcaloides del ergot** (ergotamina o dihidroergotamina, para tratar las migrañas) y **estatinas** (para el tratamiento de los niveles altos de colesterol).

Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que posaconazol puede alterar el efecto de otros fármacos.
- Comunique a su médico si está embarazada o en proceso de lactancia.
- Conducción y uso de máquinas: se aconseja no conducir y no usar máquinas si aparecen mareos, somnolencia o visión borrosa.
- Los comprimidos de posaconazol contienen **lactosa**. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org