



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ELTROMBOPAG (REVOLADE®)
(comprimidos de 25 y 50 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ELTROMBOPAG (REVOLADE®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Eltrombopag es un agonista del receptor de trombopoyetina que se utiliza en el tratamiento de la **trombocitopenia inmune primaria** en pacientes que no hayan respondido a tratamientos previos y estén esplenectomizados o la cirugía esté contraindicada.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome los comprimidos enteros con un vaso de agua (**sin masticarlos, triturarlos, ni disolverlos**).

Deben tomarse en **ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer)**

Eltrombopag **se debe tomar al menos 2 horas antes o 4 horas después de cualquiera de los siguientes productos: antiácidos, productos lácteos (u otros alimentos que contengan calcio) o suplementos minerales que contengan hierro, calcio, magnesio, aluminio, selenio o zinc.**



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida alguna toma, tómelo tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C).

Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón, cansancio, picor, tos, disminución del apetito, insomnio y ojo seco.**
- Ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar), consulte a su médico de cabecera.
- Si nota algún **signo de sangrado** (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel) o si presenta **coloración amarillenta** en la piel, ojos, u orina oscura acuda a urgencias.
- Si presenta un aumento del diámetro de la pierna y dolor torácico acompañado de dificultad respiratoria, acuda a Urgencias, ya que este fármaco puede aumentar **el riesgo de trombosis.**



¡Atención!

Comunique SIEMPRE a su médico o farmacéutico si está o piensa quedarse **embarazada** o si está en periodo de lactancia, ya que no se recomienda tomar este tratamiento durante el embarazo.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que **eltrombopag puede interactuar con numerosos medicamentos.**
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org