



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DARUNAVIR/COBICISTAT (REZOLSTA®)

800/150 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DARUNAVIR/COBICISTAT (REZOLSTA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Darunavir es un inhibidor de la proteasa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus. Cobicistat se utiliza como potenciador del efecto de darunavir.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Tome Rezolsta® **CON ALIMENTOS**. No masticar ni triturar el comprimido.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos gastrointestinales** (diarrea, vómitos), **cefalea**, **cansancio**, **aumento leve del colesterol**, **triglicéridos** y **azúcar en sangre**, erupción de la piel y aumento de sangrado en pacientes hemofílicos. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



¡Atención!

Comuníquese a su médico o farmacéutico si presenta alergia a **sulfonamidas**.

Comuníquese el uso de fármacos **antiepilépticos** (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína), **rifampicina**, **Hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*), **medicamentos para reducir el colesterol** (simvastatina o lovastatina), **medicamentos para la disfunción eréctil** (sildenafil), u otros medicamentos como alfuzosina, ticagrelor, antiarrítmicos, antihistamínicos, colchicina, rifampicina, derivados ergotamínicos, antipsicóticos y sedantes, pues pueden interferir con el efecto de darunavir.

Las **mujeres en edad fértil** deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comuníquese cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org