



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

HIDROXICARBAMIDA (SIKLOS®)

100 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



HIDROXICARBAMIDA (SIKLOS® 100 mg comp)

¿Qué es y para qué se utiliza?

La hidroxycarbamida se utiliza para prevenir las complicaciones en los pacientes con anemia drepanocítica o de células falciformes.

¿Cómo tomarlo?

- La dosis pautada de hidroxycarbamida se debe tomar **una vez al día**, preferiblemente **antes del desayuno**, con un vaso de agua o una cantidad pequeña de comida. **No chupar ni masticar los comprimidos**.
- Si el paciente no puede tragar los comprimidos, **se pueden disolver** con un poco de agua inmediatamente antes de tomarlo.
- Para ocultar el sabor amargo, se puede añadir una gota de sirope o mezclarlo con una pequeña cantidad de comida. Después de la toma se recomienda ingerir agua u otra bebida.
- **Manipulación:** se trata de un medicamento citotóxico, se **recomienda manipular con cuidado**. Lávese las manos antes y después de manipular los comprimidos. Si al manipularlo se derrama polvo de los comprimidos, limpie la superficie con un paño húmedo desechable.
- Las mujeres **embarazadas** deben **evitar manipular los comprimidos** de Siklos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Omite la dosis olvidada y toma la siguiente dosis según la pauta programada. No doubles nunca la dosis para compensar una dosis olvidada.

¿Cómo conservarlo?

- A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.
- Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.
- No utilizar Siklos después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.
- Los comprimidos fraccionados sin usar deben introducirse en el envase original y deben de usarse en tres meses.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, reacciones en la piel, inflamación o llagas en la boca (mucositis).
- Acuda a urgencias si presenta: reacción alérgica grave, dificultad para respirar, hematomas o hemorragias, fiebre, erupción roja en la piel, confusión o mareo.

Recuerde...

- Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales pueden interferir con el efecto de la hidroxycarbamida. Especialmente es importante tener precaución con algunos medicamentos antirretrovirales, fármacos mielosupresores (reducen la producción de glóbulos blancos, rojos o plaquetas) y algunas vacunas. Es necesario informar y consultar antes con tu médico o farmacéutico.
- No dejes de tomar este medicamento sin informar a tu médico o farmacéutico.
- No utilices el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
- Si tienes cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org