



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DASATINIB (SPRYCEL®)

(comprimidos de 50 y 70 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# DASATINIB (SPRYCEL®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Dasatinib es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de la **leucemia mieloide crónica** y en la **leucemia linfoblástica aguda** cromosoma Filadelfia+ .



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome los comprimidos enteros sin masticarlos, partirlos ni disolverlos.

Puede tomarlos **CON** o **SIN** alimentos, pero evitando siempre el pomelo o zumo de pomelo.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de dasatinib, tome la siguiente dosis prevista en el momento habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación.

Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **dolor de cabeza**, **tos**, **disnea** (dificultad para respirar), **nauseas**, **diarrea**, **cansancio**, **retención de líquidos** y **dolor muscular/óseo**.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar) consulte a su médico de atención primaria.



## ¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**.
- Comunique a su médico o farmacéutico si nota algún **signo de sangrado** (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel).



## Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento** (incluso los adquiridos sin receta) o producto natural que esté tomando, ya que **dasatinib puede presentar interacciones**.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)