



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

REGORAFENIB (STIVARGA®)

(comprimidos de 40 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

REGORAFENIB (STIVARGA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Regorafenib es fármaco indicado en el tratamiento del **cáncer colorrectal** y el **tumor del estroma gastrointestinal**, cuando ya se han recibido previamente otros tratamientos.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. **Debe tomarse O CON comida baja en grasa (<30%)**. Un ejemplo de comida baja en grasa: 1 porción de cereales (aprox. 30 g), 1 vaso de leche desnatada, 1 tostada con mermelada, 1 vaso de zumo de manzana y 1 taza de café o té. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Debe tomarla ese mismo día en cuanto se acuerde. **NO** debe tomar una dosis doble el mismo día para compensar una dosis olvidada. En caso de vómitos tras la administración de regorafenib, no debe tomar comprimidos adicionales.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente**. Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos secundarios más frecuentes son: **cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, reacciones cutáneas, disminución del apetito, llagas bucales, ronquera, hipertensión, anemia y mayor susceptibilidad a tener infecciones y hematomas o sangrado.**
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús y geles neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si observa las heces o la orina muy oscuras o con sangre o con hematomas importantes.
- Si tiene fiebre > 38º acuda a Urgencias
- Consulte a su médico si se siente más cansado, su piel y blanco de los ojos se vuelven amarillos, su orina se vuelve oscura o tiene náuseas y picores.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Las **mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia** deben evitar manipular este medicamento.



Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que **Regorafenib puede interactuar con numerosas sustancias**. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.**

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org