

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SUNITINIB (SUTENT®)

(comprimidos de 12.5, 25 y 50 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

SUNITINIB (SUTENT®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Sunitinib es un medicamento que se utiliza en el **tratamiento del carcinoma de células renales** avanzado o metastásico y en el tratamiento del **tumor del estroma gastrointestinal** no resecable o metastásico tras la utilización de imatinib.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. **Tome las cápsulas enteras sin masticarlas, abrirlas ni disolverlas.** Puede tomarlas **CON** o **SIN** alimentos, pero evitando siempre el pomelo o zumo de pomelo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náusea, estreñimiento, retención de líquidos, fatiga, cefalea, dolores articulares/musculares, tos, disnea, pérdida de apetito, alteración del gusto, hipotiroidismo e insomnio.**
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice ropa cómoda, calcetines de algodón, cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Vigile **su tensión arterial**, ya que sunitinib la podría incrementar.
- Acuda a Urgencias ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar).
- Si nota algún **signo de sangrado** (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel) acuda a Urgencias.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar **medidas anticonceptivas** adecuadas.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que sunitinib puede interactuar con numerosos medicamentos (ej. eritromicina, dexametasona, carbamazepina, sotalol...).
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org