



Antimicrobianos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA  
(SYM TUZA®) 800/150/200/10 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

## DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA (SYMITUZA®)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Symtuza® es una combinación de fármacos antirretrovirales para el VIH (Darunavir + Cobicistat + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida) que está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.

### ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Tome Symtuza® **CON ALIMENTOS**. En caso de necesidad, Symtuza® podría triturarse.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes (>1%) se encuentran: **cefalea, trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), alteraciones del sueño, alteraciones cutáneas (erupción, prurito, urticaria), cansancio, artralgia y aumento de los lípidos.**

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

### ¡Atención!

Comuníquese a su médico o farmacéutico si presenta alergia a **sulfonamidas**.

No se recomienda la toma de Symtuza® con otros medicamentos, como **antiepilépticos** (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína), medicamentos para reducir el colesterol (**simvastatina o lovastatina**), medicamentos para la disfunción eréctil (**sildenafil**) u otros medicamentos como **dabigatrán, ticagrelor, antiarrítmicos, antihistamínicos, derivados ergotamínicos, colchicina, rifampicina, antipsicóticos, sedantes y Hierba de San Juan.**

Comuníquese al farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de Symtuza®.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

### Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)