



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

# SILDENAFILO

Suspensión 2,5 mg/ml fr 50 ml



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



# SILDENAFILO 2,5 mg/mL suspensión oral



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).



## ¿Cómo tomarlo?

Tómelo **en ayunas** (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora.

Agite bien la suspensión antes de administrarlo.

Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.



## ¿Cómo conservarlo?

Consérvelo a temperatura ambiente, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, mareos, insomnio, diarrea, enrojecimiento de cara y cuello, sudores nocturnos, tos y congestión nasal. Si estos síntomas se vuelven severos acuda a su médico.
- Avise a su médico inmediatamente si cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas, sensación de quemazón en manos, brazos y piernas o dificultad para respirar. Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente la piel, los ojos y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.



## ¿Cómo se elabora?

### Composición por 100 ml:

Sildenafil citrato..... 350 mg

(1,4 mg de sildenafil citrato equivalen a 1,0 mg de sildenafil base)

Metilcelulosa 1% gel ..... 50 mL

Jarabe simple .....50 mL

Excipientes: este medicamento contiene sacarosa 444 mg/mL, benzoato sódico y metilparaben.



## Recuerde...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar** a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón  
915290405 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)