



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SILDENAFILO

Cápsulas 5, 10 y 15 mg



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



SILDENAFILO cápsulas



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la **hipertensión arterial pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).



¿Cómo tomarlo?

Tómelo en **ayunas** (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. **Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

Consérvelo a **temperatura ambiente**, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Puede aparecer dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, mareos, insomnio, diarrea, enrojecimiento de cara y cuello, sudores nocturnos, tos y congestión nasal. Si estos síntomas se vuelven severos acuda a su médico.
- Avise a su médico inmediatamente si presenta cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas, sensación de quemazón en manos, brazos y piernas o dificultad para respirar. Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente la piel, los ojos y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.



¿Cómo se elabora?

Composición para 100 cápsulas:

Sildenafil citrato..... X mg (1,4 mg de sildenafil citrato equivale a 1,0 mg de sildenafil base)

Dextrinomaltozac.s.p.

Riboflavina.....30 mg

Cápsulas nº 4.....100



Recuerde...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar** a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org