



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SIROLIMUS 0,4% POMADA

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

## SIROLIMUS 0,4% POMADA



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para el tratamiento de afectaciones de la piel como la esclerosis tuberosa.



### ¿Cómo se administra?

- Administración **tópica** según prescripción médica.
- Para administrarlo, utilice guantes desechables y **lávase las manos antes y después** de su aplicación. Aplicar en la zona a tratar con una espátula para evitar entrar en contacto con la pomada.
- Aplicar exclusivamente sobre la zona donde deba actuar. Evitar contacto con los ojos y la piel normal. Si entra en contacto con una zona no lesionada, lavar con agua y jabón.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



### ¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo en su envase original bien cerrado.



### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos de sirolimus por vía tópica son poco conocidos, si tiene algún síntoma que puedan estar relacionado con esta fórmula consulte inmediatamente con su médico.



### ¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento y aquellos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta) que esté tomando.

Si es una **mujer fértil** utilice **medidas anticonceptivas durante el tratamiento** y hasta 12 semanas después de su finalización. Evite la lactancia materna durante el tratamiento y hasta 12 semanas después.



### Recuerde...

- Esta fórmula se ha elaborado especialmente para usted, no lo comparta con nadie aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Si observa algún cambio en el aspecto de la fórmula consulte a su farmacéutico antes de seguir utilizándola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).



### Composición

#### Composición por envase de 20 g

Sirolimus	0,08 g
Vaselina líquida	1,15 ml
Vaselina filante	c.s.p. 20 g



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)