



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DABRAFENIB (TAFINLAR®)

(cápsulas de 50 y 75 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DABRAFENIB (TAFINLAR®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Dabrafenib se utiliza en el tratamiento del **melanoma** no reseccable o metastásico con mutación de BRAF V600 positiva.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome las cápsulas enteras, sin masticarlas, ni abrirlas, ni diluirlas.

Deben tomarse en **ayunas** (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer).

No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo durante el tratamiento.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 6 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos secundarios más frecuentes son: **fiebre, escalofríos, disminución del apetito, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolor óseo y muscular y caída del pelo.**
- Consulte a su oncólogo si presenta una temperatura superior a 38,5º.
- Consulte a su oncólogo si presenta algún **cambio en la piel** (nuevas verrugas, llagas o bultos enrojecidos, en la piel cambios en los lunares) durante el tratamiento.
- Consulte a su médico si tiene enrojecimiento e irritación de los ojos, visión borrosa, dolor u otros cambios en la visión durante el tratamiento.



¡Atención!

Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta) y productos naturales que esté tomando, ya que **dabrafenib puede interactuar con otros medicamentos.**
- **Informe a su médico si tiene que interrumpir la medicación.**
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org