



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

OSIMERTINIB (TAGRISSO®)

(comprimidos de 40 y 80 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

OSIMERTINIB (TAGRISSO®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Osimertinib es una terapia dirigida que se utiliza en el tratamiento del **cáncer de pulmón no microcítico** localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos **no se deben masticar ni machacar**. Si tiene problemas para tragarlos, contacte con su farmacéutico del hospital. Puede tomarse **con o sin alimentos, a la misma hora cada día**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, amenos que la siguiente dosis este prevista en un plazo de 12 horas. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Lávese las manos tras su manipulación. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, dermatitis, piel seca, paroniquia** (es una infección de la piel que hay alrededor de una uña de la mano o del pie), **picor en la piel, estomatitis** (inflamación del recubrimiento interno de la boca con presencia de úlceras bucales) y **un descenso de los niveles de glóbulos blancos y plaquetas**.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- No debe tomar hipérico o hierva de san juan al mismo tiempo que osimertinib.



Recuerde...

- Comuníquese con su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta) o **producto natural que esté tomando**, ya que osimertinib puede presentar interacciones.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org