



Antineoplásicos



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ERLOTINIB (TARCEVA®)

(comprimidos de 25, 100 y 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ERLOTINIB (TARCEVA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Erlotinib es inhibidor tirosin kinasa que se utiliza en el tratamiento del **cáncer de pulmón no microcítico** localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con agua. **Éstos no se deben masticar, machacar ni partir.** Deben tomarse en **ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer).**

No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **rash cutáneo (dermatitis)**, **diarrea**, **náuseas**, **vómitos**, **fatiga**, **pérdida de apetito**, **tos** y **disnea**.
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si presenta **fiebre superior a 38º C**.



¡Atención!

- Comuníquese a su médico o farmacéutico si es intolerante a la **lactosa**.
- Comuníquese a su médico o farmacéutico si nota algún **signo de sangrado** (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel).
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos
- Si es una mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas** adecuadas hasta 2 semanas después de finalizar el tratamiento.



Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya que erlotinib puede presentar interacciones (ej. omeprazol, sintrom)
- Consulte con su oncólogo habitual en la próxima visita toda aquella sintomatología que piense que pueda estar relacionada con su tratamiento oncológico.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación** no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org