



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NILOTINIB (TASIGNA®)

(cápsulas duras de 150 y 200 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# NILOTINIB (TASIGNA®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Nilotinib es un inhibidor tirosin kinasa que se utiliza en el tratamiento de la **leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia+**.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome las cápsulas enteras. **No debe abrirlas ni masticarlas.** Si tiene problemas para tragarlas, consulte a su farmacéutico del hospital.

Deben tomarse en **ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer)**. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **cefalea, náuseas, diarrea, dolor abdominal, alopecia, dolor muscular, fatiga, picor y alteración hepática.**
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar), consulte a su médico de atención primaria.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa.
- Comunique a su médico o farmacéutico si nota algún signo de sangrado (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas en la piel).
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto con las capsulas.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas hasta 2 semanas después de finalizar el tratamiento.



## Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier medicamento** (incluso los adquiridos sin receta) o producto natural que esté tomando, ya que nilotinib puede presentar interacciones
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)