



Antineoplásicos



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®)

(cápsulas duras de 5, 20, 100, 140, 180 y 250 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Temozolomida es un fármaco antitumoral **alquilante del ADN**, principalmente de la guanina, indicado para el **tratamiento de tumores cerebrales o el cáncer de pulmón**.



## ¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse **enteras con un vaso de agua y sin alimentos**, 1h antes o 2h después de comer, siempre en el **mismo horario**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

DOSIS	DÍAS	CÓMO TOMARLO
__ caps. de __ mg	Desde el __/__/__ hasta el __/__/__ (__ días)	1h antes o 2h después de comer. Tomarlo a la hora de irse a dormir puede ayudar a prevenir las náuseas.
__ caps. de __ mg		
__ caps. de __ mg		



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis.



## ¿Cómo conservarlo?

Se puede conservar a **temperatura ambiente** (30°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Evite la humedad, la luz directa y el calor.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, sequedad de piel y prurito, caída de pelo**. Debido al descenso de sus plaquetas, existe un mayor riesgo de aparición de **moratones y sangrado fácil**. Evite el uso de cuchillas, use cepillos de dientes suaves, tenga cuidado con los golpes y al manejar objetos cortantes.
- Si tiene **signos de anemia como cansancio o debilidad inusual o signos de alteración hepática como coloración amarillenta de ojos y piel**; acuda a su médico de atención primaria.
- Si tiene **signos de infección** (tos, fiebre >38º, dificultad al orinar), signos de sangrado (heces negras, sangre en orina o hematomas), **reacción alérgica grave, dolor abdominal agudo, convulsiones, cefalea intensa, o pérdida de visión**; acuda a Urgencias.



## ¡Atención!

- Comuníquese a su médico o farmacéutico si es alérgico a **temozolomida, dacarbazina** y si es intolerante a la **lactosa**. Si es **diabético** controle más estrechamente sus niveles de glucosa.
- Comente a su médico si tiene **enfermedad hepática o renal grave o inmunosupresión severa**.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.



## Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales**. **Temozolomida puede interactuar con algunas sustancias** como: ácido valpróico, ciclosporina, tacrólimus, hierba de San Juan (hipérico).
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- No deje de tomar este medicamento sin **informar a su médico o farmacéutico**.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
679050691 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org