



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DOLUTEGRAVIR (TIVICAY®)

10, 25 y 50 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DOLUTEGRAVIR (TIVICAY®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa del VIH que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por este virus.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomar Tivicay® **CON o SIN alimentos**. En caso de necesidad, Tivicay® podría triturarse.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 4 horas para la siguiente dosis. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del sueño, mareo, cansancio y erupción cutánea. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



¡Atención!

Dolutegravir no debe administrarse conjuntamente con **medicamentos antiácidos que contengan aluminio / magnesio** (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago), **suplementos de calcio o hierro** y **preparados multivitamínicos**. En caso de necesidad, tómelos al menos 6 horas antes de tomar Tivicay® o por lo menos 2 horas después de tomarlo. La administración de dolutegravir con dofetilida (antiarrítmico) e Hierba de San Juan está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de antiepilépticos como la oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital y antidiabéticos como la metformina.

Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org