



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TRAMETINIB

TRAMETINIB 0,05 mg/mL solución oral, frasco 90 mL



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



TRAMETINIB solución oral 0,05 mg/mL

¿Qué es y para qué se utiliza?

El trametinib es un fármaco que ha sido prescrito por su médico para el tratamiento del glioma.



¿Cómo tomarlo?

- Siga la pauta indicada por su médico. Se debe tomar **en ayunas**, al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer.
- Su médico y farmacéutico le indicarán qué cantidad de trametinib debe tomar.
- Manipulación: se **recomienda manipular con cuidado**. Lávese las manos antes y después de manipular el trametinib. Si al manipularlo se derrama, limpie la superficie con un paño húmedo desechable. Lave la jeringa con agua tibia y aclárela bien.
- Las mujeres **embarazadas** deben **evitar manipular** el trametinib.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Debe tomar la **dosis olvidada** sólo en caso de que **falten más de 12 horas hasta la siguiente dosis**. Si quedan menos de 12 horas hasta la siguiente administración, omita la dosis.
- Nunca doble la dosis para compensar una dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

- **Refrigerado** (entre 2-8°C). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.
- Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.
- No utilizar Trametinib después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.
- Una vez reconstituido, la caducidad es de 35 días.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: hipertensión arterial, sangrados, **diarrea, náuseas o vómitos, debilidad capilar, erupción cutánea similar al acné, trastornos en el lecho de las uñas, cansancio, edema periférico, boca seca, elevación de transaminasas**.
- Informe a su médico si experimenta sensación de mareo, palpitaciones o aumento del ritmo del corazón, sensación de falta de aire.
- Informe a su médico si presenta alteraciones visuales tales como visión borrosa, enrojecimiento e irritación en los ojos.
- Si presenta fiebre, alteraciones en la piel tales como manchas rojizas circulares en el tronco con ampollas centrales, úlceras en mucosas, erupción generalizada y ganglios linfáticos hinchados; deje de tomar la medicación y acuda a urgencias.



Recuerde...

- Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales pueden interferir con el efecto del trametinib. Especialmente es importante tener precaución con algunos medicamentos como el **verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol**. Es necesario informar y consultar antes con tu médico o farmacéutico.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación** no utilizada a la farmacia del hospital.
- Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org