



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA (Triumeq®)
50/600/300 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA (TRIUMEQ®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Triumeq® es una combinación de tres fármacos antirretrovirales para el VIH (Dolutegravir + Abacavir + Lamivudina) que está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomar Triumeq® **CON o SIN alimentos**. En caso de necesidad, Triumeq® podría triturarse.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden **menos de 4 horas** para la siguiente dosis. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del sueño, mareo y cansancio**. Puede consultar la lista completa de efectos adversos en el prospecto. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.



¡Atención!

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A ABACAVIR. Usted tiene más probabilidad de desarrollar esta reacción alérgica grave si tiene un gen llamado HLA-B*5701. Antes de iniciar el tratamiento, le deberían haber realizado la prueba de detección. Esta reacción suele ocurrir en las primeras 6 semanas de tratamiento y empeora al continuarlo. Consulte a su médico **INMEDIATAMENTE** si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.

Triumeq® no debe administrarse conjuntamente con **antiácidos** que contengan **aluminio / magnesio** (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago). En caso de necesidad, tome Triumeq® al menos 6 horas antes de los antiácidos o 2 horas después.

Si necesita tomar **suplementos de calcio o hierro y preparados multivitamínicos**, Triumeq® debe administrarse al menos 6 horas antes o 2 horas después, o tomar los dos medicamentos juntos con alimentos.

La administración de Triumeq® con **dofetilida** y **Hierba de San Juan** está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de **antiepilépticos** como la oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital y antidiabéticos como la **metformina**.

Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org