



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TREPROSTINIL (TYVASO®)

0.6 mg /ml solución para inhalación



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

TREPROSTINIL (TYVASO®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Treprostinil se emplea en el tratamiento de la **hipertensión pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).

¿Cómo utilizarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se debe administrar mediante **el inhalador Tyvaso®** aportado con la medicación al inicio. **Prepare el dispositivo al inicio del día** cargando agua destilada en el reservorio. Vierta una ampolla completa de medicación en uno de los pocillos de plástico proporcionados, contiene la dosis necesaria para todas las administraciones del día. Al final del día la medicación restante y el pocillo de plástico deben desecharse. El dispositivo **debe limpiarse al final del día** según las instrucciones de uso.

Debe realizar las inhalaciones indicadas **cuatro veces al día**, con un **intervalo aproximado entre tomas de 4h** (espaciadas de manera uniforme durante las horas de vigilia). Enjuáguese la boca con agua después de finalizar las inhalaciones. Al inicio, el número de inhalaciones irá aumentando hasta alcanzar, si tiene buena tolerancia, 9 inhalaciones repartidas cuatro veces al día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis olvidada lo antes posible a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes con treprostinil inhalado son: **tos, dolor de cabeza, náuseas, mareo, rubefacción (enrojecimiento facial), irritación de garganta, dolor faríngeo y/o laríngeo y diarrea**. En algunos casos pueden producirse **hipotensión y aumento del sangrado**.

Consulte con su médico si estos síntomas se vuelven severos e interfieren con sus actividades diarias. Informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto adverso que experimente.

Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que podrían alterar el efecto de treprostinil.
- Los datos sobre el uso de treprostinil inhalado durante el embarazo y la lactancia son limitados. Consulte con su médico si desea quedarse embarazada.
- No debe utilizar este sistema de inhalación para otros medicamentos inhalados ni mezclar treprostinil con otros. Evite el contacto de treprostinil con la piel y las mucosas. No ingiera la solución.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org