



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LAPATINIB(TYVERB®)
(comprimidos de 250 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

LAPATINIB (TYVERB®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Lapatinib es un fármaco antitumoral que inhibe los dominios intracelulares tirosin kinasa de los receptores EGFR y HER2. Indicado para el tratamiento de cáncer de mama en combinación o en monoterapia.



¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse **enteros con un vaso de agua y sin alimentos**, 1h antes o 2h después de comer, siempre en el **mismo horario**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis. Si vomita no repita la dosis.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas y vómitos, fatiga, insomnio, dolor de espalda o de cabeza, ritmo cardíaco anormal, mayor susceptibilidad a infecciones, tos, llagas en la boca o garganta (mucositis)**.
- Puede presentar **síndrome mano-pie** (enrojecimiento, descamación, hormigueo y dolor en las palmas de las manos y plantas de los pies). Evite el agua excesivamente caliente, use calcetines de algodón o plantillas de gel, utilice zapatos suaves o zapatillas. Aplique una crema que contenga lanolina en las manos y los pies.
- **Evite la exposición directa al sol**: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazo y piernas; utilice protección solar alta y protector labial.
- Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina, manchas rojizas en la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- Comente a su médico si tiene enfermedad cardíaca, hepática o de los pulmones.
- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.



Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales (como la hierba de San Juan o hipérico). Lapatinib puede interactuar con numerosos medicamentos (ej. ranitidina, fenitoína, carbamazepina, ketoconazol, voriconazol, eritromicina, ritonavir, dexametasona, digoxina). No debe tomar pomelo o zumo de pomelo.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org