



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SELEXIPAG (UPTRAVI®)

200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 mg
comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

SELEXIPAG (UPTRAVI®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Selexipag se emplea en el tratamiento de la **hipertensión pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomarse **dos veces al día**, con un intervalo aproximado entre tomas de 12h, **acompañado de alimentos**. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis olvidada lo antes posible a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **dolor de cabeza, rubefacción (enrojecimiento facial), náuseas y vómitos, diarrea, dolor mandibular, dolor muscular, dolor articular, dolor en las extremidades inferiores y nasofaringitis (congestión nasal)**. Con menor frecuencia puede aparecer: **anemia (nivel bajo de hemoglobina), hipertiroidismo, disminución del apetito, pérdida de peso, hipotensión, dolor de estómago y erupciones cutáneas**.

Consulte con su médico si estos síntomas se vuelven severos e interfieren con sus actividades diarias. Informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto adverso que experimente.

Recuerde...

- **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que podrían alterar el efecto de selexipag. Es especialmente importante que mencione el uso de **gemfibrozilo, clopidogrel, ácido valproico, probenecid, fluconazol y rifampicina**.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar **anticonceptivos** eficaces durante el tratamiento con Uptravi. Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org