



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VALGANCICLOVIR

Valcyte® 50 mg/mL solución oral, frasco 100 mL



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



VALGANCICLOVIR 50 mg/mL SOLUCIÓN ORAL

¿Qué es y para qué se utiliza?

Valganciclovir pertenece a un grupo de medicamentos denominados antivirales. Previene la multiplicación y la invasión de células sanas por el virus denominado citomegalovirus (CMV). En pacientes con un sistema inmune debilitado, el CMV puede provocar una infección en diferentes órganos del cuerpo.

¿Cómo tomarlo?

Debe tomarse **CON alimentos**, preferiblemente siempre a la misma hora.
Lávate las manos tras su manipulación. Evita el contacto de la medicación con la piel.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Toma la dosis que has olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo hagas y continúa con tu pauta habitual. **Nunca tomes el doble de dosis** para compensar la dosis olvidada.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera (2-8°C). La suspensión reconstituida caduca a los 49 días.
Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.
No lo utilices una vez superada la fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **disminución del número de glóbulos blancos (neutropenia)**, **disminución del número de glóbulos rojos (anemia)**, **diarrea y dificultad para respirar (disnea)**. Otros efectos adversos menos frecuentes son: pérdida de apetito y pérdida de peso, dolor de cabeza, insomnio, pérdida de sensibilidad en manos y pies, dolor de oídos, náuseas, vómitos, dolor de estómago, tos, mareos, dermatitis, exceso de sudoración, fiebre, cansancio y aumento de algunas enzimas hepáticas.

Se puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

Consulta a tu médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Recuerde...

- **Comunica a tu médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que valganciclovir puede alterar el efecto de otros fármacos. Valcyte puede interaccionar con algunos medicamentos como: **Hidroxiurea**, **Micofenolato**, **Trimetroprim**, **Antirretrovirales**.
- Comunica a tu médico o farmacéutico si eres **intolerante a la lactosa**. Los pacientes con problemas hereditarios raros de **intolerancia a galactosa**, **insuficiencia de lactasa de Lapp** o **malabsorción de glucosa o galactosa** no deben tomar este medicamento.
- Este medicamento se ha prescrito personalmente para ti y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los tuyos.
- Devuelve la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tires a la basura.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org