



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NINTEDANIB (VARGATEF®)

(cápsulas de 100 y 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

NINTEDANIB (VARGATEF®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Nintedanib se utiliza asociado a docetaxel en el **cáncer de pulmón no microcítico**, tipo **adenocarcinoma**, en pacientes que han recibido tratamiento previo con quimioterapia.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras sin masticarlas, abrirlas ni disolverlas. Tome las cápsulas **con alimentos** todos los días salvo el día que se le administra la quimioterapia con docetaxel. Lávese las manos antes y después de cada toma.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tome la siguiente dosis en el horario habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **diarreas, náuseas, vómitos, disminución del apetito, llagas, dolor o enrojecimiento en la boca, sensación de acorchamiento y/o hormigueo en pies y manos.**
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias si presenta **fiebre superior a 38° C** o **signos de sangrado** (heces negras, sangre en la orina, hematomas importantes).
- Consulte a su médico si se siente más cansado, su piel y blanco de los ojos se vuelven amarillos, su orina se vuelve oscura o tiene náuseas y picores.
- Si presenta un aumento del diámetro de la pierna y dolor torácico acompañado de dificultad respiratoria, acuda a Urgencias, ya que este fármaco puede aumentar el **riesgo de trombosis**.



¡Atención!

- Las personas en edad fértil, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar entrar en contacto con los comprimidos
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas.
- Si es alérgico a **la soja o a los cacahuetes**, comuníquelo a su médico o farmacéutico.



Recuerde...

- Comuníquelo a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Nintedanib puede interactuar con **diversos medicamentos** (ej. ketoconazol, carbamazepina, fenitoína, eritromicina o hierba de San Juan).
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org