



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ETOPÓSIDO (VEPESID®)

(cápsulas de 50 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ETOPÓSIDO (VEPESID®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Etopósido es un derivado semisintético de la podofilotoxina, utilizado en el tratamiento de diversos tumores.



¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse **enteras con un vaso de agua y sin alimentos**, 1h antes o 2h después de comer, siempre en el **mismo horario**. Lávese las manos antes y después de cada toma.

DOSIS	DÍAS	CÓMO TOMARLO
__ cáps. de 50 mg	Desde el __/__/__ hasta el __/__/__ (__ días)	1h antes o 2h después de comer



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta habitual. No doble la dosis para compensar una dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **mayor susceptibilidad a tener infecciones, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mucositis (llagas en la boca), pérdida de cabello, sensación de debilidad y síndrome mano-pie.**
- Si tiene fiebre > 38º o signos de infección, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o hematomas importantes), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de atención primaria.



¡Atención!

- No reciba ninguna **vacuna** sin el conocimiento previo de su médico.
- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar 2 medidas anticonceptivas, durante el tratamiento y durante 6 meses después de recibir la última dosis.**
- Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico **todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Etópósido puede interactuar con numerosas sustancias** (ej. Ciclosporina, warfarina, acenocumarol, fenitoína, fenobarbital, fenilbutazona, salicilato sódico, aspirina, etc.). **No debe tomar hierba de San Juan o hipérico, equinacea ni zumo de pomelo.**
- Comente a su médico si tiene **enfermedad hepática o renal grave o inmunosupresión severa.**
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- El Servicio de Farmacia le dispensará las cápsulas de etopósido. Si le sobra medicación, devuélvala al hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
679050691 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org