



Antineoplásicos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

PAZOPANIB (VOTRIENT®)

(comprimidos de 200 y 400 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

PAZOPANIB (VOTRIENT®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Pazopanib es un inhibidor tirosin kinasa que se utiliza en el tratamiento del **carcinoma de células renales avanzado** y en **determinados subtipos de sarcoma de tejidos blandos** avanzado que hayan recibido previamente tratamiento con quimioterapia..



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros. Éstos no se deben masticar, machacar ni partir. **Deben tomarse en ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer)**. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Sólo tome su siguiente dosis a la hora habitual.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteración del gusto, disminución del apetito, cefalea, alopecia, dermatitis, fatiga e hipertensión**.
- Vigile su **tensión arterial**, ya que Pazopanib la podría incrementar
- Puede presentar **reacciones cutáneas**: manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
- Acuda a Urgencias ante signos de **infección** (fiebre, tos persistente, dolor y dificultad al orinar), ya que puede aumentar el riesgo de infecciones.
- Acuda a Urgencias si observa las heces muy oscuras o con sangre.



¡Atención!

- Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas adecuadas**.
- Avise a su Oncólogo si va a ser **intervenido**, ya que su tratamiento con pazopanib podría ser suspendido por unos días.



Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que **pazopanib puede interactuar con numerosos medicamentos** (ej. Omeprazol, ranitidina, simvastatina, voriconazol...)
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- **Devuelva la medicación no utilizada** a la Farmacia del Hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org