



Antimicrobianos

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VALGANCICLOVIR

450 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

VALGANCICLOVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Valganciclovir pertenece a un grupo de medicamentos denominados antivirales. Previene la multiplicación y la invasión de células sanas por el virus denominado citomegalovirus (CMV). En pacientes con un sistema inmune debilitado, el CMV puede provocar una infección en diferentes órganos del cuerpo.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se recomienda tomar valganciclovir **CON ALIMENTOS**. Los comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de valganciclovir, tome la dosis olvidada tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En ese caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: **disminución del número de glóbulos blancos (neutropenia)**, **disminución del número de glóbulos rojos (anemia)**, **diarrea y dificultad para respirar (disnea)**. Otros efectos adversos menos frecuentes son: pérdida de apetito y pérdida de peso, dolor de cabeza, insomnio, pérdida de sensibilidad en manos y pies, dolor de oídos, náuseas, vómitos, dolor de estómago, tos, mareos, dermatitis, exceso de sudoración, fiebre, cansancio y aumento de algunas enzimas hepáticas.

Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



Recuerde...

- **Comuniqué a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que valganciclovir puede alterar el efecto de otros fármacos.
- Comuniqué a su médico o farmacéutico si es **intolerante a la lactosa**. Los pacientes con problemas hereditarios raros de **intolerancia a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa** no deben tomar este medicamento.
- En mujeres en edad fértil se recomienda el uso de medidas anticonceptivas eficaces durante y hasta por lo menos 30 días del tratamiento con valganciclovir. Los varones deben utilizar medidas anticonceptivas de barrera durante y hasta, por lo menos, 90 días después del tratamiento.
- Comuniqué a su médico si está embarazada o en proceso de lactancia.
- **Conducción y uso de máquinas:** Se aconseja no conducir y no usar máquinas si aparecen mareos o convulsiones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado en el envase.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org