



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VANCOMICINA oral

Cápsulas de 125 mg, 250 mg y 500 mg



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

Vancomicina oral

¿Qué es y para qué se utiliza?

Vancomicina es un antibiótico que, administrado por vía oral, se utiliza para el tratamiento de la infección causada por *Clostridiodes difficile*. Esta bacteria puede habitar en el intestino y producir diarrea, que puede ser desde leve a severa. Otros síntomas pueden incluir fiebre, pérdida de apetito, náuseas o inflamación del intestino.



¿Cómo tomarlo?

Siga las instrucciones que le ha dado su médico o farmacéutico. Tome las cápsulas enteras con un vaso de agua.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30º C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Este medicamento actúa a nivel local, sobre el intestino, por lo que el tratamiento suele ser bien tolerado. No obstante, pueden aparecer síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Comuníquese a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.



¿Qué precauciones debe seguir en el domicilio para evitar contagiar a otras personas?

La bacteria puede propagarse de persona a persona, o bien a través de contacto con superficies contaminadas. Por ello, es fundamental que la persona infectada, sus cuidadores y su familia **se laven frecuentemente las manos con agua y jabón. Debe hacerse siempre que se use el cuarto de baño y antes de comer.** Para ello, siga estas recomendaciones:

<p>0</p> <p>0. Mójese las manos con agua.</p>	<p>1</p> <p>1. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos.</p>	<p>2</p> <p>2. Frótese las palmas de las manos entre sí.</p>	<p>3</p> <p>3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.</p>	<p>4</p> <p>4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados.</p>
<p>5</p> <p>5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.</p>	<p>6</p> <p>6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con palma de la mano derecha y viceversa.</p>	<p>7</p> <p>7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.</p>	<p>8</p> <p>8. Enjuáguese las manos con agua.</p>	<p>9</p> <p>9. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.</p>
<p>10</p> <p>10. Utilice la toalla para cerrar el grifo.</p>	<p>Siempre que sea posible, la persona con diarrea por <i>C. difficile</i> debe tener su habitación y utilizar un cuarto de baño distinto.</p> <p>También debe ser exhaustiva la limpieza. Es aconsejable limpiar las superficies del baño y la cocina con lejía diluida, así como otras superficies que se tocan habitualmente: interruptores de luz, teléfonos, mandos a distancia, tiradores del baño, asiento del inodoro, pomos de puertas, etcétera.</p>			

Recuerde...

- Comuníquese a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- Vancomicina oral se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.



EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org