



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VORICONAZOL 1% colirio

Fórmula magistral



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

VORICONAZOL 1% colirio



¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza como antifúngico frente a queratitis fúngicas.



Composición


Composición por 4 mL

Voriconazol	40 mg
Agua para inyección	4 mL



¿Cómo se administra?

- Lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- Tras la administración, cierre los ojos durante 1-2 minutos. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones. Lávese las manos tras la administración.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.



¿Cómo conservarlo?

Debe conservarse en nevera y protegido de la luz.

Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días.

No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas.

Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran.



¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si:

Tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales, etc.).

No use voriconazol colirio sin primero hablar con su médico si está usted embarazada. No se conocen los riesgos que podría tener para el bebé.

Evitar su uso durante la lactancia materna.



Recuerde...

- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio lave la zona con agua abundante.
- En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 farmacia.hgugm@salud.madrid.org