



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MERCAPTOPURINA

XALUPRINE® 20 mg/mL suspensión oral, frasco 100 mL



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*



MERCAPTOPURINA 20 mg/mL suspensión oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

La mercaptopurina está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (también llamada leucemia linfocítica aguda o LLA).



¿Cómo tomarlo?

- Siga la pauta indicada por su médico. Se puede **tomar con o sin alimentos**, pero se debe seguir **siempre el mismo método** de administración. Se debe tomar **al menos 1 hora antes o 2 horas después** de ingerir leche o derivados lácteos.
- Se recomienda la **administración por la noche** para que el medicamento sea más eficaz.
- Su médico y farmacéutico le indicarán qué cantidad de mercaptopurina debe tomar.
 - ❑ Si la dosis es de 1 ml o menos, usará la jeringa más pequeña, de 1 ml.
 - ❑ Si la dosis es de más de 1 ml, usará la jeringa más grande, de 5 ml.
- Manipulación: se trata de un medicamento citotóxico, se **recomienda manipular con cuidado**. Lávese las manos antes y después de manipular el Xaluprine. Si al manipularlo se derrama, limpie la superficie con un paño húmedo desechable. Lave la jeringa con agua tibia y aclárela bien.
- Las mujeres **embarazadas** deben **evitar manipular el Xaluprine**.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Omita la dosis olvidada y toma la siguiente dosis según la pauta programada. Nunca doble la dosis para compensar una dosis olvidada.



¿Cómo conservarlo?

- A **temperatura ambiente** (no superior a 25°C). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.
- Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.
- No utilizar Xaluprine después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.
- Una vez abierto, la caducidad es de 56 días.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos adversos más frecuentes son: **nauseas o vómitos, elevación de transaminasas, cansancio, mareo, disnea, anemia, pérdida de apetito, diarrea, inflamación de la boca** (estomatitis).
- Acuda a urgencias si presenta cualquiera de estos síntomas: edema facial, erupción cutánea, fiebre, dolor articular, coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos, hematoma o sangrado inesperado.
- El xaluprine puede aumentar la **sensibilidad a la luz solar** y producir reacciones cutáneas, evite la exposición directa a la luz solar y recuerde usar crema solar con factor de protección +50.



Recuerde...

- Xaluprine contiene aspartamo (E219), parahidroxibenzoato sódico de etilo (E215) y sacarosa. El aspartamo puede ser perjudicial si usted padece fenilcetonuria y puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) por el parahidroxibenzoato sódico de etilo.
- Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales pueden interferir con el efecto de la mercaptopurina. Especialmente es importante tener precaución con algunos medicamentos como el **alopurinol**, los **anticoagulantes orales**, **mesalazina**, **sulfasalazina**, antiepilépticos como la **fenitoína** o **carbamazepina**. Es necesario informar y consultar antes con tu médico o farmacéutico.
- Si va a recibir una vacuna, consulte antes con su médico, no se recomienda el uso de vacunas que contienen microorganismos vivos. **No se vacune de la fiebre amarilla** durante el tratamiento con Xaluprine.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
- Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org