



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TOFACITINIB (XELJANZ®)

5 mg comprimidos

10 mg comprimidos



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

TOFACITINIB (XELJANZ®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Tofacitinib es un fármaco inhibidor de Janus quinasa que actúa disminuyendo la respuesta inflamatoria. Está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y colitis ulcerosa.



¿Cómo tomarlo?

Se administra por vía oral. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos. Si tiene dificultad para tragar, puede triturar los comprimidos y tomarlos con agua.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Conserve la medicación a la temperatura ambiente y en su blíster original (envase de plástico metalizado) para protegerlo de la humedad.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Pueden aparecer infecciones (neumonía, gripe, herpes zóster, infección del tracto urinario, sinusitis, bronquitis, nasofaringitis y/o faringitis).
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- No se debe utilizar tofacitinib durante el embarazo ni durante la lactancia materna. Se debe utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta al menos 4 semanas después de la última dosis.



¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica.
- Tiene alergia a la lactosa. Si tiene intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa.
- Tiene insuficiencia hepática.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.



Recuerde...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital.
- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914269271-914265094 farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org