



Antineoplásicos

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo

SaludMadrid

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

E

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE  
ENZALUTAMIDA (XTANDI®)  
(comprimidos de 40 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

# ENZALUTAMIDA (XTANDI®)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Enzalutamida es un inhibidor de los receptores de andrógenos que se utiliza en el **tratamiento del cáncer de próstata metastásico** resistente a la castración tras haber progresado a un régimen basado en docetaxel.



## ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras con agua. **Éstas no se deben masticar, abrir ni disolver.** Pueden tomarse **CON o SIN alimentos.** No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.



## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 12 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## ¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos secundarios más frecuentes son: **cansancio, dolor de cabeza, sofocos e hipertensión.**
- Otros efectos secundarios menos frecuentes podrían ser: caídas, pérdida de memoria, piel seca y picor, ansiedad, ginecomastia y fracturas.
- **Vigile su tensión arterial**, ya que la enzalutamida la puede incrementar.



## ¡Atención!

- Comunique a su médico o farmacéutico si presenta **intolerancia hereditaria a la fructosa.**
- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.
- Si mantiene relaciones con alguna mujer fértil o embarazada, **debe utilizar medidas anticonceptivas dobles** hasta 3 meses tras la finalización del tratamiento. Las mujeres fértiles o embarazadas deben evitar el contacto con el fármaco.



## Recuerde...

- **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar**, incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya que ya que la enzalutamida puede interactuar con numerosos medicamentos.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- El Servicio de Farmacia dispensará los comprimidos de enzalutamida. Si le sobra medicación, **devuélvala al hospital.**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  
915867714 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)