



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

IDELALISIB (ZYDELIG®)

(comprimidos recubiertos de 100 y 150 mg)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

IDELALISIB (ZYDELIG®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Idelalisib se utiliza, junto con rituximab, en el tratamiento de la **leucemia linfática crónica**; y también en el linfoma folicular.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con un vaso de agua. **Éstos no se deben masticar, machacar ni partir.** Pueden tomarse **CON o SIN alimentos.**



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis y han transcurrido menos de 6 horas, tome la dosis omitida inmediatamente. Después, tome la siguiente dosis de la forma habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **Temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Lávese las manos tras su manipulación. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Los efectos secundarios más frecuentes son: **diarrea, erupción, cambios en el número de glóbulos blancos, infecciones, fiebre y alteraciones hepáticas.**
- Si presenta reacciones cutáneas: utilice cremas hidratantes, protección solar y champús neutros. Si aparecen ampollas en la piel o mucosas (genitales, boca, ojos...) deje de tomar el idelalisib y contacte con su hematólogo.
- Acuda a Urgencias ante signos de **infección** (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar). Al inicio del tratamiento, su hematólogo le prescribirá otro medicamento para reducir el riesgo de infecciones.
- Consulte a su médico si se siente más cansado, su piel y blanco de los ojos se vuelven amarillos, su orina se vuelve oscura o tiene náuseas y picores.



¡Atención!

- Las **personas en edad fértil** deben evitar entrar en contacto con los comprimidos
- Si es una mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas** adecuadas durante el tratamiento con idelalisib y hasta 1 mes después de su finalización. Los anticonceptivos orales podrían no hacer efecto.



Recuerde...

- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier medicamento** (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, ya que **el idelalisib puede interactuar con numerosos medicamentos** (fentanilo, amiodarona, buprenorfina, carbamazepina, midazolam, sildenafil, simvastatina, quetiapina, etc.).
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión de la enfermedad.
- **Devuelva la medicación** no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915867714 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org