



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

BELIMUMAB (BENLYSTA®)

400mg/20 ml vial



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

BELIMUMAB (BENLYSTA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Belimumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la proteína estimuladora de linfocitos B, reduciendo los niveles de células B en sangre. Los linfocitos B son las células encargadas de producir los anticuerpos que se encuentran alterados en el **Lupus Eritematoso Sistémico**.



¿Cómo se administra?

Belimumab se administra mediante perfusión intravenosa en el Hospital de Día. La duración de la perfusión es de una hora. La dosificación se basa en el peso corporal, siendo lo habitual 10mg/kg.

En la tabla de la derecha se indica la pauta de administración de este medicamento después de su primera dosis.

2ª dosis	14 días después de su 1ª dosis
3ª dosis	28 días después de su 1ª dosis
Dosis sucesivas	Cada 4 semanas



Confirmación de la administración

Las enfermeras de Hospital de Día se pondrán en contacto por teléfono con usted 48-72 horas antes de la siguiente cita programada, para confirmar su asistencia a la administración del tratamiento.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Posibles reacciones asociadas a la inyección, incluyendo erupción cutánea, dolor de cabeza o estado febril.
- Pueden aparecer **infecciones del tracto respiratorio, urinario y digestivo, diarrea y náuseas, dolor de cabeza**, reducción de glóbulos blancos y dolor en las extremidades.
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas **vacunas**. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.



¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica o intervención dental.
- Tiene Insuficiencia cardíaca.
- Sufre o ha sufrido síntomas de depresión o comportamientos suicidas.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- Si está embarazada, si estuviera planeando estarlo o si es madre lactante.



Recuerde...

Si se cambia a la formulación subcutánea de Benlysta, la primera inyección debe ser administrada entre 1 y 4 semanas después de la última dosis intravenosa.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914269271-914265094 farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org