



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

INFLIXIMAB (REMSIMA®)

100 mg/10 mL vial



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

INFLIXIMAB (REMSIMA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Infliximab es un fármaco inhibidor del TNF- α que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades crónicas como artritis reumatoide, espondiloartritis axial, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. También puede utilizarse en otras patologías como la uveítis.



¿Cómo se administra?

Infliximab se administra mediante perfusión intravenosa en el Hospital de Día. La duración de la perfusión es de aproximadamente 2 horas, aunque puede variar según la tolerancia.

La tabla de la derecha muestra cada cuánto normalmente se le administrará este medicamento después de su primera dosis.

2ª dosis	2 semanas después de su 1ª dosis
3ª dosis	6 semanas después de su 1ª dosis
Dosis sucesivas	Cada 6 - 8 semanas



Confirmación de la administración

Las enfermeras de Hospital de Día se pondrán en contacto por teléfono con usted 48-72 horas antes de la siguiente cita programada, para confirmar su asistencia a la administración del tratamiento.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

- Posible reacción relacionada con la perfusión (dolor de cabeza, náuseas, alteraciones en la presión arterial, picor, fiebre, sofocos, erupciones en la piel, dolor abdominal, tos, diarrea y dolor de garganta).
- Pueden aparecer **infecciones del tracto respiratorio** (infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpesvirus), reducción de glóbulos blancos y/o rojos, incremento de lípidos en sangre, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, incremento de las enzimas hepáticas, eccema y dolor musculoesquelético.
- Este fármaco afecta al sistema inmunitario pudiendo modificar las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio con este fármaco deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B.
- Este fármaco puede modificar la respuesta adecuada a determinadas **vacunas**. Es recomendable una valoración de las vacunas que debe administrarse durante el tratamiento.
- Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.



¡Atención! comunique a su médico, farmacéutico o enfermera si:

- Tiene programada alguna operación quirúrgica o intervención dental.
- Tiene Insuficiencia cardiaca.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- Si está embarazada, si estuviera planeando estarlo o si es madre lactante.



Recuerde...

Informe a su médico inmediatamente si experimenta algún efecto adverso asociado a la medicación.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
914269271-914265094 farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org

Documento aprobado por la Comisión de Calidad Percibida con fecha 07/09/2021 (v. 1)