



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ELIGLUSTAT (CERDELGA®)

84 mg cápsulas



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

ELIGLUSTAT (CERDELGA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Cerdelga® es fármaco inhibidor específico de la glucosilceramida sintasa que está indicado en el **tratamiento prolongado de pacientes adultos con enfermedad de Gaucher tipo I.**



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras, preferentemente con agua, sin aplastarlas, abrirlas o disolverlas. Puede tomarlos **CON o SIN alimentos**. Evite el pomelo o zumo de pomelo porque puede aumentar el nivel de Cerdelga® en sangre.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de **6 horas** para la siguiente toma. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, ardor de estómago, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, dolor abdominal, hinchazón, dolor articular, cansancio**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Cerdelga® puede interactuar con antidepresivos, antiarrítmicos, antiinfecciosos, antieméticos, antihipertensivos, diuréticos, antineoplásicos, antiácidos, antiepilépticos, antipsicóticos, antitusivos, anticoagulantes, estatinas, colchicina, digoxina, Hierba de San Juan, goldenseal.



¡Atención!

- Aunque los estudios realizados en animales no han mostrado efectos tóxicos sobre la reproducción, es preferible evitar Cerdelga® en el embarazo. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.
- Cerdelga® contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a la lactosa, no deben tomar este medicamento.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org