



Enfermedad de Fabry

Red
H s H
Asociación
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MIGALASTAT (GALAFOLD®)

123 mg cápsulas



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

MIGALASTAT (GALAFOLD®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Galafold® es un fármaco que estabiliza la alfa-galactosidasa A para su correcta función en los lisosomas, indicado en el tratamiento a largo plazo de pacientes diagnosticados de enfermedad de Fabry y portadores de mutaciones susceptibles de responder al tratamiento.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras, sin aplastarlas, abrirlas o disolverlas. Deben tomarse **en ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer), en días alternos a la misma hora del día.**

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Galafold® **no se debe tomar durante 2 días consecutivos.**

Si olvida una dosis, puede tomarla si han pasado menos de 12 horas desde la hora habitual. Si han transcurrido más de 12 horas, reanudará el tratamiento el día correspondiente a la siguiente dosis y a la hora habitual.

¿Cómo conservarlo?

A **temperatura ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, ardor de estómago, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, dolor muscular, depresión, vértigo, sangrado nasal, prurito, exantema, aumento de peso, cansancio.** Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Galafold® puede interactuar con agalsidasa beta.

¡Atención!

- Mientras esté tomando Galafold® **debe utilizar un método anticonceptivo.** Si está embarazada, piensa que pudiera estarlo o tiene previsto quedarse embarazada, no tome este medicamento hasta que haya consultado a su médico.
- No tome este medicamento si está dando el pecho. No se sabe si este medicamento se excreta en la leche materna. Su médico decidirá si debe interrumpir la lactancia o suspender el tratamiento temporalmente.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org