



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FENILBUTIRATO DE GLICEROL (RAVICTI®)

1,1 g/ml solución oral (25mL)



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

FENILBUTIRATO DE GLICEROL (RAVICTI®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Fenilbutirato de glicerol es un fármaco que se utiliza como terapia adyuvante en el tratamiento crónico de pacientes con trastornos del ciclo de la urea que no se pueden tratar solamente con restricción de las proteínas alimentarias y/o suplementación de aminoácidos.



¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Puede tomarlo durante las comidas o justo después. Utilice una jeringa oral para medir la dosis del líquido. NO reutilice las jeringas enjuagándolas con agua tras cada administración, ya que la adición de agua provoca la degradación del medicamento (líquido turbio).



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Sin embargo, en adultos, si la siguiente dosis le toca en menos de 2 horas (30 min en el caso de los niños), sátese la dosis olvidada y tómese la siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.



¿Cómo conservarlo?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Una vez abierto el frasco, debe utilizar este medicamento en un plazo de 14 días tras la apertura. Se debe eliminar el frasco aunque no esté vacío. Los envases sin abrir no deben utilizarse después de la fecha de caducidad que se indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: alteraciones gastrointestinales (dolor de estómago, estreñimiento, diarrea o vómitos), hinchazón de manos o pies, cansancio, cefalea, mareos, temblores, olor cutáneo anormal, acné, o sangrado entre períodos menstruales. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Ravicti® puede interactuar con algunos medicamentos como midazolam, anticonceptivos orales, corticoides, inhibidores de la lipasa, ácido valproico, haloperidol o probenecid.



¡Atención!

- Si es una mujer en edad fértil, debe utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente.
- Se desconoce el grado de excreción de Ravicti en leche materna. Aunque probablemente sea compatible con la lactancia, consulte con su médico para valorar las posibles opciones en su caso particular.



Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org