



Amiloidosis por TTR

Red  
H s H  
Madrid  
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

TAFAMIDIS MEGLUMINA (VYNDAQEL®)

20 mg cápsulas



*Tu farmacéutico de hospital,  
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

## TAFAMIDIS MEGLUMINA (VYNDAQEL®)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Tafamidis meglumina es un fármaco estabilizador de una proteína denominada transtirretina (TTR), indicado en el tratamiento de pacientes con polineuropatía, para retrasar la alteración neurológica periférica causada por el acúmulo de fibras de amiloide.



### ¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras, sin aplastarlas, ni cortarlas.

Puede tomarlas CON o SIN alimentos.

Si vomita poco después de la administración y se identifica la cápsula intacta, se debe administrar otra dosis.

Si no se identifica la cápsula, reanude la administración al día siguiente.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 6 horas para la siguiente toma. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido. No deje de tomar Vyndaqel® sin consultar antes con su médico.



### ¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 25°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.



### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **infección del tracto urinario** (dolor, sensación de quemazón al orinar o necesidad de orinar con frecuencia), **infección vaginal en las mujeres**, **diarrea**, **dolor de estómago o dolor abdominal alto**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Vyndaqel® puede interactuar con algunos medicamentos como metotrexato, diuréticos, antiinflamatorios, estatinas o antivirales.



### ¡Atención!

- Si es una mujer en edad fértil debe utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento y continuar utilizándolos durante un mes tras la suspensión del mismo. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.
- Vyndaqel® contiene sorbitol. Si usted tiene intolerancia hereditaria a la fructosa, no debe tomar este medicamento.



### Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

915290405 | [farmacia.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.hgugm@salud.madrid.org)