



Síndrome de quilomicronemia familiar

Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VOLANESORSEN (WAYLIVRA®)

285 mg jeringa precargada



*Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento*

VOLANESORSEN (WAYLIVRA®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Volanesorsen (Waylivra®) es un medicamento indicado para el tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) que cursa con niveles anormalmente altos en sangre de un tipo de grasas que se conocen con el nombre de triglicéridos. **Waylivra ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en la sangre.**

¿Cómo se administra?

Se debe administrar por **vía subcutánea** los días que le indique su médico. Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración (**abdomen, muslos, brazos**) para evitar que la piel se irrite. Lávese las manos antes de cada administración, quite el protector, pellizque la piel e inserte la aguja con un ángulo de 45º con la superficie. Inyecte el líquido sujetando la jeringa con el pulgar en el émbolo, y empujelo despacio hasta el final de su recorrido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis y se da cuenta en las 48 horas siguientes, administre la dosis olvidada cuanto antes. Pero si han pasado más de 48 horas, se prescindirá de la dosis olvidada y se administrará la siguiente cuando esté previsto.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar en la caja original para protegerlo de la luz. Waylivra puede conservarse a temperatura ambiente (hasta 30º) hasta seis semanas después de sacarlo de la nevera.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **reacciones en el lugar de inyección, niveles anormalmente bajos o altos de leucocitos en sangre, disminución en el número de plaquetas, petequias (manchas rojas en la piel), sangre en orina, dolor de cabeza, mareos, trastornos de la vista, aumento de la presión arterial, dificultad para dormir, dolores musculares, tos, dificultad respiratoria.** Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando, especialmente si está en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

¡Atención!

- Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Es preferible evitar el uso Waylivra durante el embarazo.

Recuerde...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO



Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón
915290405 | farmacia.hgugm@salud.madrid.org