



Autoras

Mireia Martín Ramos (DUE CMA)
María Remedios Ureña Llàcer (DUE CMA)
Ana Belén Escribano Guijarro (TCAE CMA)
Angela María Noreña Mejía (TCAE CMA)


RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR

PARA QUE SE UTILIZA

Previene y actúa sobre la formación de coágulos en los vasos sanguíneos.

CÓMO DEBE ADMINISTRARSE

Se administra por vía subcutánea. La frecuencia de administración más usual es una vez al día, pero su médico le indicará dosis y frecuencia. Limpie la piel con alcohol en el lugar de la aplicación. Pellizque con los dedos un pliegue de piel e inserte la aguja en ángulo de 90 grados. Después inyecte la heparina. Después de retirar la aguja, no friccionar.



CÓMO DEBE CONSERVARSE

Guarde este medicamento a temperatura ambiente, sin exponerla calor ni a la luz.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA DOSIS

Administre la dosis olvidada tan pronto como se acuerde (a no ser que esté próxima la dosis siguiente) y luego vuelva a su frecuencia normal. Si olvida más de una dosis pregunte a su médico qué debe hacer.

MEDICAMENTOS A EVITAR

Asegúrese que su médico conoce los medicamentos que está tomando por si alteran la coagulación.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Llame a su médico siempre que tenga cualquiera de los efectos secundarios siguientes:

- Pícor o enrojecimiento en el punto de inyección.
- Sangrado anómalo en cualquier localización.

PRECAUCIONES

Las inyecciones intramusculares deben evitarse ya que pueden producir moraduras.

Si tiene o ha tenido úlcera de estómago, la tensión arterial alta o sufre alguna enfermedad indíquesele a su médico.