

RECOMENDACIONES PRE Y POST-OPERATORIAS IMPLANTE INTRAVÍTREO DE DEXAMETASONA (Ozurdex®)

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

DÍA DE LA INTERVENCIÓN

- 1º No es necesario que acuda en ayunas (tome una comida ligera).
- 2º Tome su medicación habitual.
- 3º Acuda siempre acompañado. El día de la intervención lávese bien la cabeza y la cara.
- 4º Registre sus datos en el Área de Admisión del Hospital
- 5º Si padece algún proceso alérgico o alergia medicamentosa, aportará los informes de las pruebas realizadas.

RECOMENDACIONES POST- INYECCIÓN:

TRATAMIENTO: EXOCÍN COLIRIO®: 1 GOTTA CADA 4 HORAS durante 1 semana tras la intervención (respetando sueño nocturno).

Para asegurar el buen resultado de la intervención debe seguir cuidadosamente las siguientes recomendaciones:

1. Evite agachar la cabeza o hacer movimientos bruscos.
2. No haga esfuerzos físicos ni cargue pesos.
3. No se toque ni frote el ojo. No apriete los párpados.

SÍNTOMAS DE ALARMA:

Con relativa frecuencia en los primeros días pueden aparecer ciertos síntomas oculares como enrojecimiento ocular, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo o picor, visión de manchas negras móviles pasajeras. Se trata de síntomas propios de la inflamación y cicatrización, normalmente pasajeros. Puede tomar analgésicos de tipo paracetamol, pero no aspirina.

Vigile las siguientes manifestaciones posteriores a la inyección. Si nota alguna de ellas acuda a Urgencias:

- Ojo rojo y dolor
- Molestias con la luz
- Visión de nuevas manchas flotantes o luces
- Pérdida brusca de visión
- alteraciones en su estado general
- aparición de hemorragias o sangrado
- Contrólese la tensión arterial.

Acudirá a la primera revisión en la fecha que le indique en el Informe de alta.